


МБОУ СОШ №4

Красная книга ХМАО

г.Сургут



Предисловие



Охраняется Красной книгой
Столько разных животных и птиц,
Чтобы выжил простор многоликий
Ради света грядущих зарниц.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты
Охраняются звери, охраняются змеи,
Охраняются даже цветы...
Мы леса и поля обижаем,
Стонут реки от горьких обид.
И пока что себя мы прощаем,
Но грядущее нас не простит.
Красная книга, Красная!
Значит природа в опасности!
Значит, терять нельзя даже мига.
Всё живое хранить зовёт,
Пусть зовёт не напрасно.
Красная книга, Красная!
В.Дубовин

Введение


- В соответствии со статьями 6, 60 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями на 14 марта 2009 года), статьями 6.1, 24 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 14 марта 2009 года), статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 года N 31-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями на 12 октября 2009 года), в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство автономного округа постановляет:
 - Утвердить Порядок ведения Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
 - Департаменту охраны окружающей среды и экологической безопасности автономного округа по согласованию с Управлением по использованию рыбных и охотничьих ресурсов автономного округа, Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, автономного округа в установленном порядке подготовить предложения о внесении изменений по ранее принятым актам автономного округа в связи с принятием настоящего постановления.
 - Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
 - Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Бухтина Г.Ф.
- (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2011 N 29-п).

Содержание

- Речной бобр
- Краснозобая гагарка
- Чёрный аист
- Белый гусь
- Гуменник
- Краснозобая казарка
- Малый лебедь
- Обыкновенный турпан
- Пискулька
- Серый гусь
- Стерх
- Беркут
- Филин
- Прыткая ящерица
- Обыкновенный тритон
- Сибирская лягушка
- Травяная лягушка
- Сибирский осетр
- Таймень
- Красотка блестящая
- Павлиний глаз малый
ночной
- Медведица Менетри


Речной бобр

Статус вида: Под угрозой исчезновения
Раздел: Млекопитающие Отряд: Грызуны
Признаки: Самый крупный грызун фауны
ХМАО. Средний вес взрослого бобра
около 19 кг, средняя длина тела 106 см, в
том числе голова около 16 см, туловище
65 см, хвост 25 см, его ширина 13 см.
Туловище имеет обтекаемую форму, его
задняя часть расширена. Голова с
маленькими ушами округлая, с
притупленной передней частью морды. Во
внешнем облике выделяются парные
резцы оранжевого цвета и широкий
плоский хвост, покрытый
многочисленными роговыми щитками.
Задние лапы вдвое длиннее и массивнее
передних, с плавательными перепонками
между пальцев. Длина задней ступни
взрослого бобра около 16 см. Окрас меха
от светло-бурых до бурых тонов.



Краснозобая гагара

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе
Раздел: Птицы
Отряд: Гагарообразные
Признаки:
Относительно крупная птица весом до 1,5 кг и с длиной крыла 257-312 мм. У взрослых птиц весной и летом верх и бока головы и шеи серые. На шее спереди большое треугольное или трапециевидное каштановое пятно. Кроющие крыльев и верх тела темно-бурые с малочисленными белыми пятнышками. Бока тела бурые с белым, низ белый, маховые и рулевые перья темно-бурые. У молодых птиц верх тела с узкими белыми черточками, на горле и шее спереди буроватый налет.



Чёрный аист

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность
Раздел: Птицы
Отряд: Аистообразные
Семейство: Аистовые
Признаки: Крупные птицы на длинных ногах. У взрослых птиц голова, шея, хвост, крылья и вся верхняя часть тела черные с зеленоватым отливом на голове, лопатках и зобе. Нижняя часть тела и подмышечные перья белые. Клюв, ноги, голая кожа на подбородке и вокруг глаз красные, глаза бурые. У молодых птиц зеленоватые клюв и ноги, перья головы, шеи и зоба со светлыми буроватыми вершинами.



Белый гусь

Статус вида: Неопределенного статуса. Особенности распространения и происхождения: редкий залетный вид. Раздел: Птицы Отряд: Гусеобразные Семейство: Утиные Признаки: Похож на других гусей, размеры средние между гуменником и белолобым. Легко узнается по белому оперению с черными первостепенными маховыми. Нередко на голове бурый или рыжий налет. Клюв и ноги розовые. Молодые птицы грязно-белые с более темным буроватым верхом головы, тела и крыльев, с серыми ногами и клювом.




Гуменник

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность. Особенности распространения и происхождения: с сокращающейся численностью таежных популяций
Раздел: Птицы
Отряд: Гусеобразные
Семейство: Утиные
Признаки: Крупный гусь размером примерно с серого, в среднем несколько меньше. От других гусей отличается черным клювом с оранжевой или желтой предвершинной полосой и очень темными (темнее туловища) головой и шеей, кроме того, от серого гуся отличается оранжевыми ногами, бурыми верхними кроющими крыла, от белолобого . отсутствием белого пятна на лбу и черных пятен на брюхе. Молодые птицы окрашены более монотонно из-за менее ярких светлых каемок на перьях, клюв короткий красновато-серый или грязно-коричневый.



Краснозобая казарка

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе – Р
Раздел: Птицы
Отряд: Гусеобразные
Семейство: Утиные
Признаки: Птица размером с небольшого гуся, весом 1-1,7 кг и с длиной крыла 332-390 мм. Окраска состоит из сочетаний черного, белого и каштаново-красного. Клюв очень маленький (23-26 мм). С большого расстояния наиболее заметны черное брюхо и бок, а над ними широкая белая полоса. Окраска молодых менее яркая, чем у взрослых птиц, зоб желтее, шире белые полосы, на крыле 3-5 белых полос (вместо двух у взрослых).




Малый лебедь

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность. Раздел: Птицы Отряд: Гусеобразные Семейство: Утиные Признаки: Очень похож на кликуна, но меньше размером. Эти лебеди надежно. Различаются только по окраске клюва: у малого лебеда клюв черный примерно наполовину, а желтый цвет заходит на черную вершину клюва под прямым или почти прямым углом. У молодых птиц примерно так же распределена светло-серая окраска основания и более темная. вершины клюва. Голова у малого лебеда более округлой формы, не столь вытянута, как у кликуна.




Обыкновенный турпан

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе – R
Раздел: Птицы
Отряд: Гусеобразные
Семейство: Утиные
Признаки: Крупная нырковая утка. У самца оперение бархатно-черное, клюв оранжевый с черным, слегка вздутый у основания, под глазом маленькое полукруглое белое пятно, глаза белые, лапы малиново-красные, с черными перепонками. Самка темно-бурая, на щеке два размытых беловатых пятна (могут отсутствовать); лапы желтовато-или красновато-бурые, глаза бурые, клюв серый. От синьги и гаг хорошо отличаются белым «зеркалом» на второстепенных маховых перьях.



Пискулька

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность – V Раздел: Птицы Отряд: Гусеобразные Семейство: Утиные
Признаки: Очень похожа на белолобого гуся, но меньше его, вес 1,2-2,5 кг, длина крыла 290-388 мм. Надежные отличительные признаки заметны только с близкого Расстояния, вокруг глаза узкое желтое кожистое кольцо. Белое лобное пятно появляется к первой весне. Оно больше, чем у белолобого гуся, и у взрослых птиц, как правило, заходит на темя. Длина клюва менее 38 мм. При навывке можно отличить с большого расстояния по сравнительно узким крыльям, их частым взмахам и голосу, обычно более звонкому, чем у белолобого гуся.




Серый гусь

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность – V Раздел: Птицы Отряд: Гусеобразные Семейство: Утиные Признаки: Крупный гусь размером немного меньше домашнего. Отличается от гуменника и белолобого гуся светло-серой окраской. Особенно заметен серебристо-серый цвет верха крыльев. От гуменника отличается также светлой головой и шеей, розовым цветом клюва и ног, от белолобого гуся. отсутствием большого белого пятна на лбу, розовыми ногами, на брюхе не бывает больших черных пятен, могут быть только мелкие темные пестрины. Окраска молодых птиц более монотонная, менее выражены светлые полосы на крыле и боках, а брюхо темнее, чем у взрослых.



Стерх

Статус вида: Под угрозой исчезновения -
Е Раздел: Птицы Отряд:
Журавлеобразные Семейство:
Журавлиные Признаки: Немного крупнее
серого журавля, размах крыльев 210-240
см, вес 8-9 кг. Все оперение белое,
кроме черных первостепенных маховых
перьев. Ноги, клюв и голая "лицевая"
часть красные. Молодые птицы в первую
осень грязно-рыжие. В годовалом
возрасте рыжие перья сохраняются на
голове, шее, спине и крыльях. Птицы
приобретают взрослый наряд на третий
год жизни.



Беркут

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность - V Раздел: Птицы Отряд: Соколообразные Семейство: Ястребиные Признаки: Наиболее крупный орел с размахом крыльев до 2 м и весом 4-5 кг. У взрослых птиц окраска темно-бурая. На затылке, подхвостье, голених и брюшной стороне примесь золотисторыжеватого цвета. Хвост серый с разорванными бурыми полосами и широким черноватым концом. Первостепенные маховые перья черно-бурые. Клюв серовато-бурый, восковица и лапы желтые. У молодых птиц хвост белый с широкой темной предвершинной полосой, первостепенные маховые перья с белыми основаниями. От других орлов старые птицы отличаются беловатым основанием хвоста, а молодые - двухцветным хвостом. Молодой беркут отличается от орлана-белохвоста относительно длинным и закругленным хвостом и белым пятном на нижней стороне крыла.



Филин

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность - V Раздел: Птицы Отряд: СOVOобразные Семейство: Совиные Признаки: Очень крупная сова с размахом крыльев 1,5-1,8 м и весом 3-4 кг. Лицевой диск слабо развит, хорошо выражены перьевые "уши". Окраска верха варьирует от темно-рыжей с черными пестринами до охристой с немногими пятнами. Грудь рыжая или охристая с продольными пестринами радужина глаз красновато-коричневая, клюв черный, лапы оперены до когтей. Все оперение мягкое и рыхлое, рассчитано на бесшумный полет. Призывный крик самца мощный "бу-у" или "гу-уу". Призывной крик самки "уууух" более продолжительный, ниже тоном и односложный. Эти крики самца и самки объединяются в песню-дуэт, которая перерастает в единый мощный гул и заканчивается раскатистым "хохотом" самца.



Прыткая ящерица

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе – R Раздел: Рептилии Отряд: Чешуйчатые Семейство: Ящерицы
Признаки: Размеры тела взрослых особей . 100-120 мм без хвоста. Окраска тела у самцов желтовато-бурая, салатовая, зеленоватая и ярко-зеленая; у самок желтовато-коричневая, коричневая, буровато-серая. Нижняя часть тела зеленоватая, желтоватая или голубоватая, обычно с мелкими темными пятнами. Вдоль хребта взрослых особей проступают отдельные неправильной формы темно-бурые или черные пятна, располагающиеся в один или два параллельных ряда, при этом они разделены светлой срединной линией. Зеленые тона в период размножения и осенью у самцов становятся более яркими.



Обыкновенный тритон

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе – R
Раздел: Амфибии Отряд: Хвостатые
Семейство: Саламандровые
Признаки: Это один из самых мелких тритонов. Длина тела взрослого тритона достигает 62 мм. Кожа гладкая и слабозернистая. Окраска верхней стороны тела оливково-бурая, нижней – желтоватая с мелкими темными пятнышками. На голове тритона расположены темные продольные полосы, одна из которых всегда проходит вдоль глаза и хорошо заметна. Тритоны легко опознаются по голубой окантовке хвоста и брюха. Масса тела до 3 г у самок и 2 г у самцов. В отличие от самки, самец имеет зубчатый гребень вдоль середины спины и широкие перепонки на задних ногах. Спинная и брюшная поверхности самца покрыты крупными темными пятнами, которые редуцированы или отсутствуют на спине и боках самки; на брюхе самки мелкие пятнышки. У самцов фоновая окраска спины всегда темнее.



Сибирская лягушка

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе – R Раздел: Амфибии Отряд: Бесхвостые Семейство: Лягушки
Признаки: Это самая маленькая из бурых лягушек. Сверху окраска тела темно-бурая, вдоль середины спины и головы проходит светлая полоса, окаймленная рядами черных пятен, характерна зернистость кожи по бокам туловища. Брюхо белое или желтовато-белое с кроваво-красными пятнами неправильной формы, в брачный период брюхо светлеет. Небольшой внутренний пяточный бугор. Височное пятно большое. Длина тела достигает 84мм. Самца можно отличить от самки по брачным мозолям на 1-м пальце передних ног.




Травяная лягушка

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе – R Особенности распространения и происхождения: Редкий на периферии ареала вид. Раздел: Амфибии Отряд: Бесхвостые Семейство: Лягушки Признаки: Это крупная лягушка. Окраска сверху оливковая, оливково-коричневая, серо-коричневая, красновато-коричневая, коричневая, серая или желтая. Брюхо и задние ноги снизу белые, желтоватые или сероватые с мраморным рисунком. Морда тупая, закругленная. Внутренний пяточный бугор низкий, как правило, треугольной формы. На шее находится железистое пятно своеобразной формы. Длина тела достигает 100 мм. Самца можно отличить от самки по брачным мозолям на 1-м пальце передней ноги, в брачный период – по голубоватому горлу и светлой и сероватой окраске; самка в брачный период имеет более коричневую или красновато-коричневую окраску .



Сибирский осетр

Статус вида: Уязвимый, сокращающий численность – V Раздел: Рыбы Отряд: Осетрообразные Семейство: Осетровые
Признаки: Удлиненное веретенообразное тело покрыто 5 рядами костных жучек, между которыми рассеяны мелкие звездчатые костные пластинки. Голова сверху покрыта костными щитками. Рот на нижней стороне головы в виде поперечной щели, опоясан мясистыми губами. Перед ним 4 усика в поперечном ряду. Спинных жучек 11-17 (в среднем 14), боковых 33-49 (до 51), брюшных (7-12 (9-10). Жаберных тычинок 24-37, обычно 30-31 [3]. В спинном плавнике 37-49, обычно 42-43 ветвистых луча, в анальном плавнике 20-28, обычно 24-25 лучей. Верхняя лопасть хвостового плавника загнута вверх (гетеро-церкальный плавник). В настоящее время в Оби и Иртыше вылавливаются особи в возрасте 15-59 лет с массой тела 15-60 кг. Средняя масса 22 кг, максимальная масса до 150-180кг.



Таймень

Статус вида: Под угрозой исчезновения – Е
Раздел: Рыбы Отряд: Лососеобразные
Семейство: Лососевые Признаки: Тело
удлиненное, спина широкая. Голова
большая (20,5 -24,9 % длины тела),
уплощенная. Наличие зубов на сошнике и
небных костях в виде сплошной полосы. На
первой жаберной дужке 11-12 тычинок.
Окраска темная, от коричнево-красной на
спине до серебристой на брюшке, на боках
черные крестообразные пятна. Ко времени
нереста у тайменя окраска становится
более яркой, в частности нижняя часть
хвостового стебля и анальный плавник
приобретают оранжево-красную окраску. У
молоди тайменя имеются 7-10 темных
поперечных полос по бокам тела




Красотка блестящая

Статус вида: Неопределенного статуса – I Особенности распространения и происхождения: представитель пойменных энтомоценозов. Раздел: Насекомые Отряд: Стрекозы Семейство: Красотки Признаки: Средних размеров стрекоза с темными крыльями. Размах крыльев 65- 75 мм, длина брюшка 34-38 мм. Тело самцов металлически-синее, крылья у основания и у вершины бесцветные, середина крыла с широкой синей или темно-синей перевязью; у самок тело золотисто-зеленое, а крылья почти бесцветные с зелеными жилками.



Павлиний глаз малый ночной

Статус вида: Неопределенного статуса - I
Особенности распространения и происхождения: Редкий вид, характеризующийся локальностью популяций, представитель энтомоценозов лиственных лесов.
Раздел: Насекомые Отряд: Чешуекрылые Семейство: Павлиноглазки Признаки: Размах крыльев 55-75 мм. Общий тон передних крыльев самца желтовато-серый, задних рыжий; общий тон крыльев самки светло-серый. Крылья со светло-серой внешней каймой, несколькими двойными волнистыми линиями и глаз-чатыми пятнами с черным ободком и центром. Тело опушенное, усики у самцов гребенчатые, у самок короткопильчатые.



Медведица Менетри

Статус вида: Редкий, малочисленный в природе - Р Особенности распространения и происхождения: Широко распространенный, но крайне редкий и малочисленный таежный вид. Раздел: Насекомые Отряд: Чешуекрылые Семейство: Медведицы Признаки: Сравнительно крупная желтоватая бабочка, размах крыльев 52-68 мм. Крылья полупрозрачные, передние - желтые, с широким буровато-черным окаймлением вдоль жилок, иногда с поперечными бурыми пятнами. Задние крылья оранжево-желтые. Усики черные, у самца пилovidные, у самки - простые. Глаза небольшие, овальные, покрыты светлыми волосками, более густыми в их задней части. Тело желтое, сверху с крупными черными пятнами, на сегментах брюшка - пятна поперечные.



Люди, берегите природу!

