

Профилактика потери слуха у детей
Приобретенной потери слуха можно избежать, следуя мерам предосторожности:

- Не подвергайте ребенка воздействию громких звуков в раннем возрасте. Это может повредить барабанные перепонки малыша.
- Не давайте ребенку наушники до 6-7 лет.
- Давайте ребенку беруши или защитные наушники всякий раз, как он будет подвергаться воздействию громких звуков (музыкальные концерты, живые матчи и т.д.).
- Не позволяйте ребенку играть с очень маленькими игрушками, которые могут случайно попасть в ухо.
- Не разрешайте ребенку смотреть телевизор или слушать музыку на большой громкости.



Лечение потери слуха у детей
(необходимо проконсультироваться со специалистом)

- ★ *Медикаменты*
- ★ *Слуховые аппараты*
- ★ *Хирургия*
- ★ *Кохлеарный имплантат*
- ★ *Логопедия*

Рекомендации родителям, воспитывающим ребёнка с нарушением слуха



Челябинск, 2022

Родители должны соблюдать требования слухоречевого режима

- Создание благоприятных условий для организации слухоречевого развития ребёнка в семье;
- Обеспечение бесперебойного функционирования индивидуальных слуховых аппаратов;
- Развитие речи в обиходе и домашней обстановке;
- Добросовестное выполнение рекомендаций педагогов, направленных на оптимальное развитие слухоречевых возможностей ребёнка;
- Знание дактильной азбуки и основ структуры дефекта своего ребёнка;
- Своевременное консультирование и лечение узкими специалистами ребёнка в случае необходимости.

Особенности развития детей с нарушением слуха:

- ★ отставание в психофизическом развитии от слышащих сверстников, в среднем, на 1-3 года
- ★ низкая двигательная активность
- ★ замедлен темп двигательной деятельности
- ★ нарушена координация движений и ориентация в пространстве
- ★ трудности в переключении внимания
- ★ запоминание базируется на зрительных образах
- ★ процесс усвоения информации замедлен
- ★ трудности в общении со сверстниками и окружающими людьми

